

Comparación de los Dos Tipos De Aborto De Primer Trimestre

Una Guía Para Pacientes

Pastilla Abortiva/Aborto Médico (Mifeprex con Misoprostol)	Aborto Quirúrgico (Aspiración Vacua)
1. ¿Cuántas semanas de embarazo puedo tener?	
<p>Hasta 9 semanas del primer día de la menstruación más reciente (63 días). El índice de éxito es de 95-99%.</p>	<p>Hasta 14 semanas del primer día de la menstruación más reciente. El índice de éxito para una succión es de 98-99%. Un embarazo con menos de 6 semanas incrementará la posibilidad de que el aborto por succión falle.</p>
2. ¿Cuánto tiempo tarda?	
<ul style="list-style-type: none"> • Son dos (2) citas con el proveedor. • Se toma el Mifeprex el Día 1. • Inserte el <i>misoprostol</i> dentro de la vagina 8 a 72 horas después. • Generalmente toma varias horas para que el aborto suceda. • Hay que regresar a la clínica 2 semanas después. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es una (1) cita con el proveedor. • El procedimiento abortivo dura de 5 a 10 minutos.
3. ¿Qué tan doloroso es?	
<p>Pueden haber cólicos moderados o muy fuertes y náuseas que van y vienen a lo largo del aborto. Pastillas para dolor ayudan a disminuirlos.</p>	<p>Pueden haber cólicos moderados o muy fuertes durante el aborto. Pastillas para dolor ayudan a disminuirlos.</p>
4. ¿Cuánto voy a sangrar?	
<p>Es común tener sangrado abundante y coágulos durante el aborto. Después, sangrado más ligero con coágulos podrá durar de 7 a 14 días, o más. La cantidad de sangrado es parecido a la de un aborto por succión, aunque dura más tiempo.</p>	<p>Generalmente hay sangrado ligero que dura de 1 a 7 días, pero podrá continuar hasta 2 semanas. La cantidad de sangrado es parecido al del aborto médico, pero la mayor pérdida de sangre ocurre durante los 5 a 10 minutos que dura el procedimiento.</p>
5. ¿Cuánto cuesta?	
<p>\$375 – Incluye la visita, el medicamento y una cita de revisión dentro de 2 semanas.</p>	<p>\$415 – Incluye la visita, procedimiento y medicamentos para las pacientes que tiene entre 5-12 semanas.</p> <p>\$510 – Incluye la visita, procedimiento y medicamentos para las pacientes que tienen entre 12-14 semanas.</p>
6. ¿Puede el aborto fallar?	
<p>El índice de éxito varía según el tiempo de embarazo y el protocolo usado. Si falla, es necesario hacer un aborto por succión.</p>	<p>El índice de éxito es más del 98%. En menos de 2% de los casos, el procedimiento falla y hay que hacerlo de nuevo.</p>

Pastilla Abortiva/Aborto Médico <i>(Mifeprex)</i>	Aborto Quirúrgico (Succión o Aspiración Vacua)
7. ¿Es seguro? ¿Podré tener hijos después?	
<ul style="list-style-type: none"> * Estos medicamentos han sido estudiados y utilizados sin incidentes. Es raro que haya complicaciones. * No afecta futuros embarazos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Han estudiado el aborto por succión por más de 30 años. El índice de complicaciones en abortos hechos durante el primer trimestre es menos de 1%. Es por lo menos 10 veces más seguro que un parto. * No afecta futuros embarazos salvo en casos de raras complicaciones graves.
8. ¿Cuáles son las ventajas?	
<ul style="list-style-type: none"> * Para algunas mujeres parece más natural, como un aborto espontáneo. * No requiere inyecciones, anestesia, instrumentos ni una máquina de aspiración vacua, a menos que el método falle. * Puede ser más exitoso que el aborto quirúrgico en embarazos tempranos. * El estar en la casa en vez de en un consultorio puede ser más reconfortante y privado. * Todas personas de apoyo pueden estar presentes durante el proceso del aborto. 	<ul style="list-style-type: none"> * Es rápido y se completa en unos pocos minutos. * Es muy exitoso. * Hay menos sangrado (que es visto por la mujer) que en un aborto médico. * Hay personal médico presente. * Generalmente hay una consejera disponible antes, durante y después del procedimiento para proporcionar apoyo emocional.
9. ¿Cuáles son las desventajas?	
<ul style="list-style-type: none"> * Dura varios días. * No es totalmente predecible. * El sangrado puede ser muy abundante y durar más de lo que se espera de un aborto por succión. * Los cólicos pueden ser severos y generalmente duran más que los del aborto por succión. * Los medicamentos pueden provocar náuseas. * Hay que venir a dos consultas con el proveedor. * Falla con poquita más frecuencia que el aborto por succión. 	<ul style="list-style-type: none"> * Es necesario que el personal médico inserte instrumentos al útero. * La anestesia y los medicamentos usados para manejar dolor durante el procedimiento pueden causar efectos secundarios. * Pueden haber complicaciones, aunque en menos de 1% de los casos. * La mujer tiene menos control sobre el procedimiento abortivo y quienes la pueden acompañar. * Puede ser menos exitoso que el aborto médico en embarazos tempranos.

Fuente: www.theaccessproject.org

Modificado: 8/11 SL/MC